
## Präeklampsie und angiogene Marker

## Leitfaden für die Praxis



<sup>\*</sup> Wert > 3. Quartil | PE: Präeklampsie | NPV: negativ-prädiktiver Wert | PPV: positiv-prädiktiver Wert



## Literatur:

- 1. AWMF-Leitlinie 015/018: Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen:
- Diagnostik und Therapie, 2019.
  D. Schlembach, S. Verlohren, E. Klein et. al.: Der sFlt-1/PIGF-Quotient in Prädiktion und Diagnostik der Präeklampsie. Frauenarzt 2015, S.
- 3. Dröge LA, Verlohren S: Präeklampsie: Aktuelle diagnostische und therapeutische Aspekte. Gynäkologe 2017; 50: 213-221. DOI: 10.1007/s00129-017-4033-3.
- Zeisler H, Llurba E, Chantraine F et al.: Predictive Value of the sFlt-1:PIGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med 2016 Jan; 374: 13–22. DOI: 10.1056/NEJMoa1414838.
- 5. Zeisler et al.: The sFlt-1/PlGF Ratio: ruling out pre-eclampsia for up to 4 weeks and the value of retesting. Ultrasound Obstet Gynecol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/uog.19178

Stand: August/2019

Ihr Ansprechpartner: Dr. Müller Mustermann **Spezifikation Spezifikation** E-Mail: mueller.mustermann@muster.de

Telefon: 123 456789



Herausgeber: © Limbach Gruppe SE – 08/2019\_V4