



Medizin. Leitung:
Dr. med. R. Czieschnek
Dr. med. R. Siegmund

Gemeinschaftslabor Suhl,
Albert-Schweitzer-Str. 4,
D-98527 Suhl


Sekretariat:
Telefon: +49 / 3681 / 39860
Telefax: +49 / 3681 / 398625
Internet: www.labor-suhl.de

Dr. med. Robert Siegmund
FA Laboratoriumsmedizin

Email
r.siegmund@glab-suhl.de

Suhl, den 25. August 2009 RS/

Diagnosestrategie Diabetes mellitus:



Hinweis: bei pathologischem Ergebnis soll zur Bestätigung im Laufe der nächsten Tage zunächst eine Kontrolluntersuchung durchgeführt werden

Die gestörte Nüchtern-glukose (impaired fasting glucose, IFG) und die gestörte Glucosetoleranz (impaired glucose tolerance, IGT) sind nach der Definition der ADA intermediäre Stadien zwischen normaler Glukosehomöostase und Diabetes (sozusagen „Prädiabetes“). Sie sind, mit Ausnahme in der Schwangerschaft, keine klinischen Entitäten, aber Risikofaktoren für einen späteren D.m. und kardiovaskuläre Erkrankungen.

- nach: 1. Thomas L, Ansorg R. Labor und Diagnose : Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik : [Jubiläumsausgabe 30 Jahre]. 7. Aufl. ed. Frankfurt am Main: Th-Books, 2008:2016 S.pp.
2. Leitlinie der DDG „Definition, Klassifikation und Diagnostik des Diabetes mellitus“ 10/2004